

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### Vimpat 150 mg filmomhulde tabletten

Lacosamide

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.**

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

**In deze bijsluiter:**

1. Wat is Vimpat en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Vimpat inneemt
3. Hoe wordt Vimpat ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vimpat
6. Aanvullende informatie

#### 1. WAT IS VIMPAT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Vimpat wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaalde vorm van epilepsie (zie hieronder) bij patiënten van 16 jaar en ouder. Vimpat wordt gebruikt als aanvulling op andere geneesmiddelen tegen epilepsie (anti-epileptica).

Epilepsie is een aandoening waarbij patiënten herhaaldelijk stuipen (toevallen, epileptische aanvallen) krijgen. Vimpat wordt gebruikt voor die vorm van epilepsie waarbij de stuipen aanvankelijk slechts één kant van de hersenen treffen, maar zich later kunnen uitbreiden naar grotere gebieden aan beide kanten van de hersenen (partieel beginnende aanval met of zonder secundaire generalisatie).

#### 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIMPAT INNEEMT

**Neem Vimpat NIET in**

- wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor lacosamide of voor pinda's of voor soja of voor één van de andere bestanddelen van Vimpat (worden vermeld in rubriek 6). Als u er niet zeker van bent of u allergisch bent, vraag dit dan aan uw arts
- wanneer u lijdt aan een bepaalde vorm van hartritmestoornissen (tweede- of derdegraads AV blok)

**Wees extra voorzichtig met Vimpat**

Licht uw arts in over de volgende situaties:

- wanneer u een geneesmiddel inneemt dat een afwijking op het ECG (elektrocardiogram) kan veroorzaken, die 'verlenging van het PR-interval' wordt genoemd, zoals geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van onregelmatige hartslag of voor hartfalen. Wanneer u er niet zeker van bent of de geneesmiddelen die u inneemt dit effect kunnen hebben, vraag dit dan aan uw arts.
- wanneer u aan een ernstige hartaandoening lijdt, zoals hartritmestoornissen, hartfalen of een hartaanval.

Vimpat kan duizeligheid veroorzaken, waardoor het optreden van door een ongeval veroorzaakt letsel of vallen zou kunnen toenemen. U moet daarom voorzichtig zijn totdat u gewend bent aan de effecten die dit geneesmiddel mogelijk op u heeft.

Een gering aantal mensen dat werd behandeld met anti-epileptica zoals lacosamide heeft gedachten gehad om zichzelf te verwonden of zichzelf te doden. Raadpleeg onmiddellijk uw arts, zodra deze gedachten bij u opkomen.

#### **Inname met andere geneesmiddelen**

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit is met name belangrijk als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hartproblemen (zie ook hierboven 'Wees extra voorzichtig met Vimpat').

#### **Inname van Vimpat met voedsel en drank**

U mag Vimpat met of zonder voedsel innemen.

Het is niet raadzaam alcohol te drinken wanneer u met Vimpat wordt behandeld, omdat u zich door Vimpat moe of duizelig kunt voelen. Het drinken van alcohol kan deze effecten verergeren.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Gebruik van Vimpat tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, omdat de effecten van Vimpat op de zwangerschap en de ongeboren baby niet bekend zijn. Licht uw arts onmiddellijk in als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Hij/zij zal beslissen of u Vimpat moet innemen.

Tijdens het gebruik van Vimpat dient u geen borstvoeding te geven, omdat niet bekend is of Vimpat in de moedermelk wordt uitgescheiden. Als u borstvoeding geeft, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. Hij/zij zal beslissen of u Vimpat moet innemen.

Onderzoek bij kinderen van vrouwen die anti-epileptica gebruiken heeft een verhoogd risico op geboortefwijkingen aangetoond. Aan de andere kant moet een effectieve anti-epileptische behandeling niet worden onderbroken, daar de verergering van de aandoening zowel voor de moeder als voor het ongeboren kind schadelijk is.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Vimpat kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Dit kan uw vermogen om een auto te besturen of gereedschap of machines te gebruiken beïnvloeden. U mag niet autorijden of machines gebruiken totdat u weet of dit geneesmiddel een negatieve invloed heeft op uw vermogen dergelijke handelingen uit te voeren.

#### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vimpat**

Vimpat bevat sojalecithine. Neem geen Vimpat-tabletten in als u allergisch bent voor pinda's of soja (zie ook rubriek 2 'Neem Vimpat Niet in').

### **3. HOE WORDT VIMPAT INGENOMEN**

Volg bij het innemen van Vimpat nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

#### **Dosering**

Vimpat moet tweemaal per dag worden ingenomen, eenmaal 's morgens en eenmaal 's avonds, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Vimpat wordt gebruikt voor behandeling op lange termijn.

De gebruikelijke startdosering voor Vimpat is 100 mg per dag - waarvan 50 mg 's ochtends wordt ingenomen en 50 mg 's avonds. Uw arts kan uw dagelijkse dosis elke week met 100 mg verhogen, totdat u de zogenaamde onderhoudsdosis tussen 200 mg (tweemaal daags 100 mg) en 400 mg per dag (tweemaal daags 200 mg) bereikt. Deze onderhoudsdosis gebruikt u voor de behandeling op lange termijn.

Uw arts kan u een andere dosis voorschrijven, als u problemen heeft met uw nieren.

#### **Hoe worden Vimpat-tabletten ingenomen**

U moet de Vimpat-tablet met een glas water doorslikken. Vimpat mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

#### **Duur van de behandeling met Vimpat**

Vimpat wordt gebruikt voor behandeling op lange termijn. U moet doorgaan met het innemen van Vimpat totdat uw arts aangeeft dat u daarmee moet stoppen.

#### **Wat u moet doen als u meer van Vimpat heeft ingenomen dan u zou mogen**

Als u meer van Vimpat heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan contact op met uw arts.

#### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vimpat in te nemen**

Als u een paar uur te laat bent voor een dosis, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem dan de overgeslagen tablet niet meer in. Neem Vimpat gewoon weer in op hetzelfde tijdstip als u het normaal in zou nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het innemen van Vimpat**

Stop niet met het innemen van Vimpat zonder dit met uw arts te bespreken, omdat uw symptomen weer terug kunnen komen of erger kunnen worden.

Als uw arts beslist dat u moet stoppen met de behandeling met Vimpat, dan zal hij/zij u uitleggen hoe u de dosis stap voor stap moet verminderen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Vimpat bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequentie van de hieronder genoemde mogelijke bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

zeer vaak: komt bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voor

vaak: komt bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers voor

soms: komt bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers voor

zelden: komt bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers voor

zeer zelden: komt bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers voor

niet bekend: (frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat)

Zeer vaak voorkomend: komt bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voor

- Duizeligheid, hoofdpijn
- Misselijkheid
- Dubbel zien (diplopie)

Vaak voorkomend: komt bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers voor

- Evenwichtsproblemen, problemen bij het coördineren van uw bewegingen, problemen met uw geheugen, slaperigheid, trillingen (tremor), problemen met nadenken of met het vinden van woorden, snelle en ongecontroleerde bewegingen van de ogen (nystagmus)
- Wazig zien
- Een draaierig of schommelend gevoel (vertigo)
- Braken, obstipatie, overmatige gasvorming in de maag of darmen
- Jeuk
- Vallen
- Vermoeidheid, problemen met lopen, ongebruikelijke vermoeidheid en zwakte (asthenie)
- Depressie

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## 5. HOE BEWAART U VIMPAT

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Vimpat niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blisterverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

## 6. AANVULLENDE INFORMATIE

### Wat bevat Vimpat

Het werkzame bestanddeel is lacosamide.

Eén tablet Vimpat 150 mg bevat 150 mg lacosamide.

De andere bestanddelen zijn:

*Tabletkern:* microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, laag gesubstitueerd

hydroxypropylcellulose, watervrij colloïdaal silicium, crospovidon, magnesiumstearaat

*Filmomhulling:* polyvinylalcohol, polyethyleenglycol, talk, sojalecithine, hypromellose, titaniumdioxide (E171), kleurstoffen\*

\* De kleurstoffen zijn:

150 mg tablet: geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172)

### Hoe ziet Vimpat er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Vimpat 150 mg zijn zalmkleurige, ovale filmomhulde tabletten, waarin aan de ene kant 'SP' is gegraveerd en aan de andere kant '150'.

Vimpat is verkrijgbaar in verpakkingen met 14, 56 en 168 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussel, België.

Fabrikant: UCB-Group, Schwarz Pharma AG., Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Duitsland.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

**België/Belgique/Belgien**

UCB Pharma SA/NV  
Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

**Luxembourg/Luxemburg**

UCB Pharma SA/NV  
Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

**България**

Ю СИ БИ България ЕООД  
Тел.: + 359 (0) 2 962 99 20

**Magyarország**

UCB Magyarország Kft.  
Tel.: + 36-(1) 391 0060

**Česká republika**

UCB s.r.o.  
Tel: + 420 221 773 411

**Malta**

Pharmasud Ltd.  
Tel: + 356 / 21 37 64 36

**Danmark**

UCB Nordic A/S  
Tlf: + 45 / 32 46 24 00

**Nederland**

UCB Pharma B.V.  
Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

**Deutschland**

UCB GmbH  
Tel: + 49 / (0) 2173 48 4847

**Norge**

UCB Nordic A/S  
Tlf: + 45 / 32 46 24 00

**Eesti**

UCB Pharma Oy Finland  
Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)

**Österreich**

UCB Pharma GmbH  
Tel: + 43 (1) 291 80 00

**Ελλάδα**

UCB A.E.  
Τηλ: + 30 / 2109974000

**Polska**

UCB Pharma Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 (0)22 696 99 20

**España**

UCB Pharma, S.A.  
Tel: + 34 / 91 570 34 44

**Portugal**

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda  
Tel: + 351 / 21 302 5300

**France**

UCB Pharma S.A.  
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

**România**

UCB Pharma Romania S.R.L.  
Tel: + 40 21 300 29 04

**Ireland**

UCB (Pharma) Ireland Ltd.  
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

**Slovenija**

Medis, d.o.o.  
Tel: + 386 1 589 69 00

**Ísland**

Vistor hf.  
Tel: + 354 535 7000

**Slovenská republika**

UCB s.r.o., organizačná zložka  
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

**Italia**

UCB Pharma S.p.A.  
Tel: + 39 / 02 300 791

**Suomi/Finland**

UCB Pharma Oy Finland  
Puh/Tel: + 358 10 234 6800

**Κύπρος**

Lifepharm (Z.A.M.) Ltd  
Τηλ: + 357 22 34 74 40

**Sverige**

UCB Nordic A/S  
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

**Latvija**

UCB Pharma Oy Finland  
Tel: + 358 10 234 6800 (Somija)

**United Kingdom**

UCB Pharma Ltd.  
Tel : + 44 / (0)1753 534 655

**Lietuva**

UCB Pharma Oy Finland  
Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.**

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMA) <http://www.emea.europa.eu/>.